



# EI Tiergesundheit und Salmonellen

**Finde die markierten Wörter aus dem Text im Suchgitter!**  
**Sie sind senkrecht und waagrecht (auch gegen die Schreibrichtung) versteckt!**

In allen **Haltungsformen** kann es sein, dass sich die Hühner gegenseitig picken. Das **Federpicken** kann viele verschiedene Ursachen haben. Die österreichischen **Eier**erzeugungsbetriebe haben dementsprechend viele Maßnahmen dagegen umgesetzt. Diese haben etwa das Licht und die Einrichtung im Stall sowie das Futter betroffen. So bleiben die **Schnäbel** österreichischer Hühner heute ganz.

Die Küken und späteren Legehennen werden in ihrer ersten Lebenswoche gegen **Salmonellen** geimpft. An der Henne erkennt man eine **Infektion** nicht, daher werden Proben am **Stallboden** genommen und im Labor untersucht. In den letzten Jahren, waren von 1.000 Herden nur zwei betroffen. Die Infektion mit für den Menschen gefährlichen Salmonellen macht den Hennen an sich nichts. Im Legehennenbereich werden **Antibiotika** nicht routinemäßig, aber im Bedarfsfall für die ganze Herde eingesetzt.

M	S	D	Y	B	U	V	P	M	E	T	I	J	K	U
W	C	S	A	L	M	O	N	E	L	L	E	N	T	X
E	H	N	P	O	U	M	T	A	N	V	E	J	I	O
A	N	Q	W	A	K	I	T	O	I	B	I	T	N	A
M	Ä	K	L	Q	S	X	D	Q	J	W	D	S	F	J
H	B	N	E	K	C	I	P	R	E	D	E	F	E	Q
V	E	I	I	D	Q	U	J	Z	P	E	R	Y	K	Y
H	L	U	F	U	T	L	O	J	G	R	Z	B	T	T
D	U	G	M	X	X	O	D	R	S	R	N	B	I	W
X	D	L	K	I	K	E	B	M	F	L	F	F	O	E
I	Q	M	N	E	D	O	B	L	L	A	T	S	N	Y
C	M	R	O	F	S	G	N	U	T	L	A	H	H	S
H	Q	X	N	W	Y	K	R	X	N	J	V	Q	F	Q
W	O	R	A	E	B	U	C	Z	D	E	R	E	I	E
J	N	Y	V	E	Y	K	T	N	N	Y	F	N	K	J

